

• 专题 •

非言语声音和言语声音表征关系的研究

刘方松¹, 王强^{2,3}, 柳妍^{2,3}, 陈静¹, 宋鲁平^{2,3}, 韩在柱¹, 毕彦超¹

[摘要] 目的 研究在汉语背景下,非言语声音和言语声音在大脑中的表征关系。方法 对39例脑损伤患者和39例正常对照组进行声音-图片核证测验和声音属性判断,采用Crawford和Garthwaite的分离软件对患者的数据进行分析。结果 群组分析显示,患者在言语声音理解测验和非言语声音理解测验的成绩显著正相关;个体分析显示,部分患者表现出非言语声音理解正常,言语声音理解损伤;部分患者则表现出言语声音理解正常,非言语声音理解损伤。结论 在汉语背景下,言语声音和非言语声音在大脑中是独立表征的。失语症患者的语言康复过程中,不仅要重视言语声音的训练,还要重视非言语声音的训练。

[关键词] 脑损伤; 言语声音; 非言语声音; 双分离

Relationship between Representation of Non-verbal Sound and Verbal Sound LIU Fang-song, WANG Qiang, LIU Yan, et al. State Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

Abstract: Objective To study the relationship between representations of verbal sound and non-verbal sound in the brain. Methods 39 patients with brain injury and 39 healthy volunteers were recruited in this study. They were tested with the sound-verification task (a non-verbal sound test) and the sound attribute judgment task (a verbal sound test). The software developed by Crawford and Garthwaite was used for data analysis. Results Group analysis revealed a positive correlation between the verbal sound test and non-verbal sound test. As for case analysis, some patients were impaired in the comprehension of verbal sound test, but normal in the comprehension of non-verbal sound test. In contrast, some patients were impaired in the comprehension of non-verbal sound test, but normal in the comprehension of verbal sound test. Conclusion Verbal sound and non-verbal sound are represented independently in the brain. In the process of language rehabilitation of aphasia, attention should not only be paid to verbal sound training, but also to non-verbal sound training.

Key words: brain injury; verbal sound; non-verbal sound; double dissociation

[中图分类号] R742 [文献标识码] A [文章编号] 1006-9771(2011)03-0204-03

[本文著录格式] 刘方松,王强,柳妍,等. 非言语声音和言语声音表征关系的研究[J]. 中国康复理论与实践,2011,17(3): 204—206.

在失语症患者的临床康复过程中,我们往往集中于言语声音理解的训练,如句子听力理解,经常忽略对非言语声音理解的训练,如自然界声音的理解训练。自然界的声音是指生活中物体发出来的声音,比如动物的声音、人做动作的声音。在国外,一些研究者通过脑损伤患者发现言语声音和非言语声音在行为测验上产生分离。例如他们很早就发现纯词聋患者对言语声音理解困难,但是对非言语声音理解正常^[1-5]。而声音失认症的患者,却表现出相反的模式,即对非言语声音理解困难,言语声音理解正常^[6-8]。人们还通过现代脑成像技术进一步支持言语声音和非言语声音在大脑不同的脑区进行加工^[9-10]。Saygin等发现1例患

者,在脑损伤初期,言语声音和非言语声音理解都出现严重的损伤;进行了12周言语声音的训练之后,患者在言语声音任务上恢复正常,而非言语声音的理解能力仍然受损^[11]。以往发现的言语声音信息和非言语信息分离的病例,常常是个案研究,不同研究间被试的母语、实验任务、测试材料均不同,因此可比性比较弱。本研究采用汉语被试,利用大样本组群研究方式,来考察这两种不同的声音信息是否存在明显的分离。如果存在这种分离,特别是双分离,则为言语声音和非言语声音信息加工的相对独立性提供了强有力的证据。同时,也为汉语脑损伤患者的语言临床康复提供了理论指导。

1 对象与方法

1.1 研究对象 随机选取2009年8月~2010年3月中国康复研究中心住院或门诊治疗的脑损伤患者39例。入选标准:①年龄在20岁以上,受教育年限≥6年;②各种类型的脑损伤患者;③首次脑损伤;④没有其他神经、精神问题,如酗酒、严重抑郁等;⑤听力正常,能完成简单的认知任务,能理解简单的指导语。其中男性34例,女性5例,年龄(45±11.69)岁;受教育

基金项目:1. 国家自然科学基金(30770715,30700224);2. 国家社会科学基金(07CYY009);3. 北京市自然科学基金(7082051);4. 国家“十一五”科技支撑计划(2008BAI50B00)。

作者单位:1. 北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京市100875;2. 首都医科大学康复医学院,北京市100068;3. 中国康复研究中心北京博爱医院神经康复二科,北京市100068。作者简介:刘方松(1986-),男,江西九江市人,硕士研究生,主要从事认知神经心理学研究。通讯作者:韩在柱、宋鲁平。

年限(14±3.4)年。

选取与脑损伤患者年龄、教育年限匹配($P > 0.05$)的正常成人39例。其中男性23例,女性16例,年龄(49±9.69)岁;受教育年限(14±4.02)年。

1.2 方法

1.2.1 测量工具 声音-图片核证测验(N=42):考察被试非言语声音理解的损伤程度。对于每个项目,在触摸屏上给被试呈现1张黑白图片(如狗的图片),同时双耳呈现声音(如猴子的声音),让被试判断听到的声音是不是图片中的物体发出来的。让被试用手指点击屏幕上要选的答案,通过电脑记录反应是否正确。回答正确记1分,回答错误记0分。

声音属性判断测验(N=45):考察被试言语声音理解的损伤程度。对于每个项目,通过听觉和视觉同时呈现一个问题(比如,声音比较尖锐的是?)和两个选项(比如,猴子和母牛),让被试用手指点击屏幕上要选的答案,通过电脑记录反应是否正确。回答正确记1分,回答错误记0分。

图片知觉测验(N=25):考察被试图片识别能力的损伤程度。对于每个项目,在触摸屏上给被试呈现3张图片,上方1张,下方2张,让被试从下方2张图片中选出1张与上方图片一样的物体。被试用手指点击屏幕上要选的答案,通过电脑记录反应是否正确。回答正确记1分,回答错误记0分。

1.2.2 实施方法 采集被试者一般情况和患者病史。测验实施过程在安静、通风的房间进行,由合格的主试给出指导语,待被试明白要求之后让被试用手指点击要选的答案,通过电脑记录被试反应。

1.3 统计学方法 为了控制3个任务的难度,根据正常对照组在这3个任务上正确率的平均数和标准差,得到脑损伤患者在这3个任务上的正确率的Z分数。挑选图片识别正常(Z分数在±1.96之间)的患者,将这些患者在言语声音任务和非言语声音任务的Z分数进行群组分析和个体分析。

群组分析:对患者在言语声音任务和非言语声音任务上的Z分数计算Pearson相关系数。

个体分析:采用Crawford和Garthwaite(2007)开发的分离软件来考察患者在两个任务上是否存在经典分离或强分离^[13]。经典分离是指被试在某个任务上的成绩正常,在另一个任务上的成绩显著低于正常人;强分离是指被试在某个任务上的成绩显著低于在另一个任务上的成绩^[14]。

2 结果

39例患者中有35例在图片知觉测验上的表现正常,因此对这35例患者进行群组分析和个体分析。

2.1 群组分析 35例患者在声音-图片核证任务与声

音属性判断任务成绩正相关($r=0.444, P<0.05$)。

2.2 个体分析 在声音-图片核证任务中,35例患者中有16例成绩显著低于正常人;在声音属性判断任务中,39例患者中有8例成绩显著低于正常人。在两个任务中表现出分离的患者有13例。其中3例患者表现出言语声音理解损伤,非言语声音理解正常;9例患者表现出非言语声音理解损伤,言语声音理解正常。两组行为模式表现出经典的双分离。表现出强分离的患者1例,其非言语声音理解和言语声音理解都出现损伤,但是非言语声音理解的损伤程度显著高于言语声音理解的损伤。

3 讨论

本研究显示,脑损伤患者在言语声音和非言语声音理解的正确率正相关,表明这两个任务在一定程度上考察相同认知过程,或者在完成这两个任务中应用相同的认知加工模块。声音-图片核证任务是国际上常用来考察非言语声音的理解任务^[15]。而国际上常用的考察言语声音理解的任务不是声音属性判断任务,而是采用听力呈现的词汇-图片核证任务。这一任务的优点在于控制额外变量的影响,如两个任务都是让被试看一个图片并听一个声音,但是它的不足在于这两个任务考察的可能不是同一种语义知识,如果被试在声音-图片核证任务和词汇-图片核证任务上出现分离,原因可能是这两种任务考察的语义知识的分离,而不是言语声音和非言语声音之间的分离。为了排除这种可能性,本文采用同样是考察声音知识的声音属性判断作为言语声音理解的任务。同时,为了排除声音-图片核证中图片识别的影响,本文采用BORB测验中的图片知觉测验来排除图片识别损伤的患者。

双分离现象经常用于研究两个认知过程在大脑中相对独立表征关系。如果两个认知过程在被试间表现出了双分离现象,说明这两个认知过程在大脑中是相对独立表征的,即一个认知过程不受另外一个认知过程的影响,可以独立损伤。本文采用Crawford和Garthwaite(2007)开发的分离软件来考察患者在两个任务上是否存在经典分离或强分离。结果发现部分患者表现出言语声音理解损伤,非言语声音理解正常,部分患者则表现出相反的模式,在多个患者中发现经典双分离。这一系列分离的发现强有力地支持国外的研究结果^[1-10],同时也说明汉语的言语声音理解和非言语声音理解在大脑中也是独立表征的。

本研究的结果说明,言语声音理解和非言语声音理解是两种不同的认知过程,提示我们在训练患者理解周围人说话能力的同时,还要重视培养患者理解环境中声音意义的能力,如动物叫的声音、人拍手的声音等。Saygin等发现的个案^[11]以及本研究的结果相信

能给语言康复工作带来很多启示。

[参考文献]

- [1]Auerbach SH, Allard T, Naeser M, et al. Pure word deafness. A analysis of a case with bilateral lesions and a defect at the prephonemic level[J]. Brain, 1982, 105:271–300.
- [2]Coslett HB, Brashear HR, Heilman KM. Pure word deafness after bilateral primary auditory cortex infarcts[J]. Neurology, 1984, 34: 347–352.
- [3]Di Giovanni M, D'Alessandro G, Baldini S, et al. Clinical and neuro-radiological findings in a case of pure word deafness[J]. Ital J Neurol Sci, 1992, 13:507–510.
- [4]Tanaka Y, Yamadori A, Mori E. Pure word deafness following bilateral lesions. A psychophysical analysis[J]. Brain, 1987, 110:381–403.
- [5]Yaqub BA, Gascon GG, Al-Nosha M, et al. Pure word deafness (acquired verbal auditory agnosia) in an Arabic speaking patient[J]. Brain, 1988, 111:457–466.
- [6]Spreen O, Benton AL, Fincham RW. Auditory agnosia without aphasia[J]. Arch Neurol, 1965, 13:84–92.
- [7]Fujii T, Fukatsu R, Watabe S, et al. Auditory sound agnosia without aphasia following a right temporal lobe lesion[J]. Cortex, 1990, 26:263–268.
- [8]Taniwaki T, Tagawa K, Sato F, et al. Auditory agnosia restricted to environmental sounds following cortical deafness and generalized auditory agnosia[J]. Clin Neurol Neurosurg, 2000, 102:156–162.
- [9]Thierry G, Giraud AL, Price C. Hemispheric dissociation in access to the human semantic system[J]. Neuron, 2003, 38:1–20.
- [10]Price C, Thierry G, Griffiths T. Speech-specific auditory processing: where is it? [J]. Tren Cogn Sci, 2005, 19: 271–276.
- [11]Saygin AP, Leechd R, Dick F. Nonverbal auditory agnosia with lesion to Wernicke's area[J]. Neuropsychologia, 2010, 48: 107–113.
- [12]Riddoch MJ, Humphreys GW. BORB: Birmingham Object Recognition Battery [M]. Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates, 1993:101–154.
- [13]Crawford JR, Garthwaite PH. Comparison of a single case to a control or normative sample in neuropsychology: Development of a Bayesian approach[J]. Cogn Neuropsychol, 2007, 24:343–372.
- [14]Negri GAL, Rumiati RI, Zadini A, et al. What is the role of motor simulation in action and object recognition? Evidence from apraxia [J]. Cogn Neuropsychol, 2007, 24(8):795–816.
- [15]Hocking J, Price CJ. Dissociating verbal and nonverbal audiovisual object processing[J]. Brain Lang, 2009, 108:89–96.

(收稿日期:2011-01-30)

• 专题 •

汉语深层失读语音诱发和语义诱发的个案研究

郑秀丽¹, 谢欲晓², 宋鲁平³, 尹文刚⁴

[摘要] 目的 研究语义诱发对汉语深层失读症的疗效。方法 对1例汉语深层失读患者给予声母诱发(语音诱发)、语义关联词诱发、数量词诱发、语境诱发和实物诱发(后四者均为语义诱发)。结果 各项语义诱发的正确率均显著高于语音诱发($P < 0.001$)。结论 语义诱发对汉语深层失读较语音诱发更有效。

[关键词] 深层失读;语音诱发;语义诱发;康复;汉语

Semantic Inducement and Phonetic Inducement for Chinese Deep Dyslexia: A Case Study ZHENG Xiu-li, XIE Yu-xiao, SONG Lu-ping, et al. An Institute of Airforce, Beijing 100085, China

Abstract: Objective To investigate the semantic induce effects in reading disorder of the Chinese deep dyslexia. Methods A patient with deep dyslexia was researched with initials inducement (as phonetic inducement), semantic—related words inducement, numeral inducement, quantifier inducement, context inducement and actual object inducement (all as semantic inducement). Results The rate of correct results were more with semantic inducements than with phonetic inducement (91.30%, 76.67%, 94.44%, 83.33% vs 44.44%, $P < 0.001$). Conclusion The semantic induce training is more effective than the phonetic induce training on Chinese deep dyslexia.

Key words: deep dyslexia; semantic induce; phonetic induce; rehabilitation; Chinese

[中图分类号] R742 [文献标识码] A [文章编号] 1006-9771(2011)03-0206-03

[本文著录格式] 郑秀丽, 谢欲晓, 宋鲁平, 等. 汉语深层失读语音诱发和语义诱发的个案研究[J]. 中国康复理论与实践, 2011, 17(3):206–208.

汉语深层失读在临幊上并不少见,对这些患者的传统康复治疗技术偏重于语音的反复记忆,以及围绕

基金项目:1. 国家“十一五”科技支撑计划(2008BAI50B00);2. 中国科学院“科技助残”项目(KGCX2-YW-609)。

作者单位:1. 空军某研究所,北京市 100085;2. 中日友好医院物理康复科,北京市 100029;3. 首都医科大学康复医学院,中国康复研究中心神经康复二科,北京市 100068;4. 中国科学院心理研究所,北京市 100101。作者简介:郑秀丽(1978-),女,山西长治市人,博士,主要研究方向:神经心理学。通讯作者:尹文刚。

语音进行各种诱发性的训练。汉语是携带语义信息的一种表义文字,本研究旨在通过实验对比研究语音和语义两种诱发对于汉语深层失读患者的训练效果。

1 深层失读症的概念和汉字特点的简介

1.1 深层失读的概念 深层失读(deep dyslexia)是一类特殊的阅读障碍类型,其重要特征是这类患者在阅读过程中犯大量的语义性错误(semantic errors)^[1]。对汉语深层失读的研究发现^[2-5],汉语的深层失读症与拼音文字的深层失语症的表现比较相似,但在表现形

非言语声音和言语声音表征关系的研究

作者: 刘方松, 王强, 柳妍, 陈静, 宋鲁平, 韩在柱, 毕彦超
作者单位: 刘方松, 陈静, 韩在柱, 毕彦超(北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室, 北京市, 100875), 王强, 柳妍, 宋鲁平(首都医科大学康复医学院, 北京市, 100068; 中国康复研究中心北京博爱医院神经康复二科, 北京市, 100068)
刊名: 中国康复理论与实践 [STIC]
英文刊名: CHINESE JOURNAL OF REHABILITATION THEORY AND PRACTICE
年, 卷(期): 2011, 17(3)

参考文献(15条)

1. Hocking J;Price CJ Dissociating verbal and nonverbal audiovisual object processing 2009
2. Negri GAL;Rumiati RI;Zadini A What is the role of motor simulation in action and object recognition? Evidence from apraxia[外文期刊] 2007(08)
3. Crawford JR;Garthwaite PH Comparison of a single case to a control or normative sample in neuropsychology:Development of a Bayesian approach[外文期刊] 2007
4. Riddoch MJ;Humphreys GW BORB:Birmingham Object Recognition Battery 1993
5. Saygin AP;Leech R;Dick F Nonverbal auditory agnosia with lesion to Wernicke's area 2010
6. Price C;Thierry G;Griffiths T Speech-specific auditory processing:where is it 2005
7. Thierry G;Giraud AL;Price C Hemispheric dissociation in access to the human semantic system 2003
8. Taniwaki T;Tagawa K;Sato F Auditory agnosia restricted to environmental sounds following cortical deafness and generalized auditory agnosia 2000
9. Fujii T;Fukatsu R;Watabe S Auditory sound agnosia without aphasia following a right temporal lobe lesion 1990
10. Spreen O;Benton AL;Fincham RW Auditory agnosia without aphasia 1965
11. Yaqub BA;Gascon GG;Al-Nosha M Pure word deafness (acquired verbal auditory agnosia) in an Arabic speaking patient 1988
12. Tanaka Y;Yamadori A;Mori E Pure word deafness following bilateral lesions.A psychophysical analysis 1987
13. Di Giovanni M;D'Alessandro G;Baldini S Clinical and neuroradiological findings in a case of pure word deafness 1992
14. Coslett HB;Brashear HR;Heilman KM Pure word deafness after bilateral primary auditory cortex infarcts 1984
15. Auerbach SH;Allard T;Naeser M Pure word deafness.Analysis of a case with bilateral lesions and a defect at the prephonemic level[外文期刊] 1982